



Colas Északkó Kft.

3915 Tarcal, Malom u. 10.

Termékismertető, felhasználási javaslat a Bodrogkeresztúri Riolitufa ásványi trágya, talajjavító őrlemény felhasználásához

	Szakasz	Lényeges jellemzők
Termékjellemzők (1272/2008. EK rendelet alapján)	1.1.	Méregjelzés nélküli.
	1.2.	Nem veszélyes munkaegészségügyi és élemezésegészségügyi szempontból.
	1.3.	Védőfelszerelés használata kötelező (védőkesztyű, védőruha, szemvédő, arcvédő). Nem megfelelő szellőzés esetén légzésvédelem kötelező: A ₁ P ₂ szűrőbetéttel ellátott por elleni légzésvédő.
	1.4.	Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás: „nem jelölésköteles”
Felhasználási javaslat (felhasználás, ajánlott dózisosok) Összetétel: NÉBIH eng.: 04.2/761-1/2016 4. pont	2.1.	<ul style="list-style-type: none">- Felhasználható bármely kertészeti illetve szántóföldi kultúrában. Adagolható közvetlen ültetőgödörbe. Kiváló palántázáshoz és ültetőközeg adalékanyagaként. Használható komposztálás során illetve keverve virágfölddel, szervestrágyával 20-30% arányban. Gyepek, pázsitok telepítése előtt illetve faiskolákban.- Kiváló háziállatok almozására, szagtalanításra nedvszívó képessége révén.- Felhasználható ökológiai gazdálkodásban talajjavításra és tápanyag utánpótlásra. NÉBIH eng.: 04.2/761-1/2016
	2.2.	<ul style="list-style-type: none">- Kötött, agyagos talajok esetén lazításra, tápanyag utánpótlásra: 0,5-2 kg/m² 0-15 cm bemunkálva szántóföldi növény-, zöldségfélék és álló szőlő- gyümölcsültetvények alá.- Homok, vályog talajok esetén szerkezet javításra, tápanyag utánpótlásra: 1-3 kg/m² 0-15 cm bemunkálva szántóföldi növény-, zöldségfélék és álló szőlő- gyümölcsültetvények alá.- Felhasználható továbbá palántázott növényeknél ültetőgödörbe, tápkockába talajjal keverve 5-15 dkg.- Szőlő- gyümölcs telepítéskor ültetőgödörbe talajjal, érett istálló- vagy komposzt trágyával keverve 0,5-1 kg.- Gyümölcsfák tányérjába 1-2 cm vastagon terítve, sekélyen bemunkálva.
	2.3.	<u>Egyéb területen:</u> <ul style="list-style-type: none">- Palántanevelésnél: 1-3 kg/m² (zöldségfélék, virág, stb.)- Üveg- és fóliaházi termesztésnél: 1-3 kg/m² ültetés előtt bemunkálva.- Egyéb nevelő, hajtató edények esetén: 20-30% arányban talajjal keverve vagy felszíni rétegbe bemunkálva.
Alkalmazás eredményei	3.1.	<ul style="list-style-type: none">- Minden talajtípuson tartósan javul a talajszerkezet, könnyebbé válik a talajművelés.- Csökken a talajhőmérséklet ingadozása.- Javul a víztartó képesség, csökken az erózió hatása.- Javul a tápanyagellátottság, a növények fejlődése és egészségi állapota.- A talaj kémhatását a semleges tartomány felé stabilizálja.- A növény és zöldségfélék hozama, minősége javul (íz, zamatanyag).- Gyümölcsültetvények hozamnövekedése mellett a tárolhatóság, az íz- és zamatanyagok javulása várható.- Szőlőtermesztésnél növekszik a must cukorfoka, a hozamnövekedés mellett csökken a hajtások száma, javul a héj és beltartalmi arány, csökken a fagyérzékenység.- Gyümölcs és erdészeti szaporítóanyag előállítás során növekedett az első osztályú szaporítóanyag aránya. Új erdőtelepítéseknél nőtt a megeredési arány és csökken a kipsztlási százalék.- Állattartásban az alom és a keletkezett trágyák kezelése révén bűz és fertőzésmentes környezet alakítható ki. Fokozódik a trágya nitrogén értéke. A szervestrágyázással együtt megvalósítható a riolitufa őrleményvel végzett talajjavítás.

Kiadás kelte: 2020.02.01.

Dr. Tamás András